

# LAS AVES DE LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE: UNA PERSPECTIVA COMPARADA

---

*Rafael Romero Porrino*  
*[www.naturaracena.blogspot.com](http://www.naturaracena.blogspot.com)*

## INTRODUCCIÓN: LA COMARCA

La comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche se extiende por todo el tercio norte de la provincia de Huelva, abarcando una superficie de más de 300.000 ha y acogiendo a 29 municipios en los cuales viven casi 40.000 personas. Se trata de una comarca donde existen numerosos pequeños núcleos de población diseminados (unos 70), cuyos habitantes participan de una economía eminentemente rural, basada en la ganadería, la industria cárnica y el turismo como principales sectores, aunque sin desdeñar la relevancia de los aprovechamientos forestales y cinegéticos.

Se trata de un área de clima mediterráneo templado, con ombroclimas seco, subhúmedo y húmedo, con un régimen de precipitaciones alto (se superan los 1.100 mm anuales en algunas áreas) y con el típico relieve ondulado de media montaña, característico de Sierra Morena. Es un territorio eminentemente forestal, donde predominan las dehesas, los alcornocales y las manchas de matorral, con una cierta implantación de plantaciones de pinos y eucaliptos; llaman la atención las formaciones de castañar, robledal y algunos bosques de ribera bien conservados. Los espacios abiertos son cuantitativamente poco importantes. La red hidrográfica tiene una gran consistencia, siendo muchos los ríos, arroyos y barranquillos que riegan la Sierra, los cuales vierten sus aguas a tres cuencas hidrográficas (Guadiana,

Guadalquivir y Odiel); existen asimismo varios embalses, dos de ellos de gran capacidad. La mayor parte de sus tierras se encuentra bajo alguna figura de protección

<b>Figura</b>	<b>Nombre</b>	<b>Extensión (ha)</b>
Parque Natural	Sierra de Aracena y Picos de Aroche	186.827
Reserva de la Biosfera	Dehesas de Sierra Morena	
Paraje Natural	Sierra Pelada y rívera del Aserrador	12.226
	Peñas de Aroche	718
Monumento Natural	Encina de la Dehesa de S. Francisco	0,20
Reserva Natural Concertada	Puerto Moral	125,85
LIC	Rivera de Chanza	70,06
	Mina Carpio	11,31

Tabla 2: Figuras de protección en la Sierra (el Parque y los Parajes son también ZEPA y LIC)

Las infraestructuras están representadas por una tupida red de caminos rurales, carreteras secundarias y veredas, que originariamente contribuyeron al trasiego de los serranos y sus ganados entre los distintos pueblos de la Comarca.

Todos los factores aquí resumidos, además de otros más puntuales como la rarefacción del conejo, la baja densidad de población humana, la afluencia turística localizada, la escasez de cortados rocosos, el abandono de los cultivos y el aumento de masas forestales en parajes remotos y tranquilos, condicionan la comunidad de aves de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

## LAS AVES

Las aves son muy difíciles de encuadrar exclusivamente en un hábitat, pero a continuación trataremos de asociar cada especie al que consideramos es más característica. No pretendemos ser exhaustivos, sino que el lector se haga una idea de las aves que va a encontrarse en los distintos hábitats de la Comarca, así como de las especies más destacadas por su originalidad en contextos ornito-geográficos comparables o cercanos, de modo que serían las principales bazas del turismo ornitológico en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Al tratarse de un área de clima mediterráneo y carácter forestal, la ornitofauna de la Comarca está formada principalmente por aves propias de ambientes forestales mediterráneos (dehesas, alcornocales, bosques mixtos y de ribera) y por las ligadas al matorral mediterráneo. Pero, debido a la importante red hidrográfica, también tienen una considerable representación las asociadas a humedales. Más escasas resultan las que viven en espacios abiertos, estando ausentes las especies esteparias, y en medios urbanos. Por otra parte, la suavidad climática y la elevada humedad y pluviometría imperantes en algunas áreas permiten la presencia de ciertas especies, o de buenas poblaciones de otras, que están ausentes o resultan más escasas en comarcas del entorno, en el resto de Sierra Morena o incluso en la España meridional, dándole a la avifauna local algo así como un “toque norteño”.

A día de hoy son **189 especies** de aves las que hay citadas, número importante ya que se trata de un área grande, pero de relativa homogeneidad paisajística.

Reproductoras	105
Invernantes	30
Migrantes	31
Accidentales	21
Residentes no reproductoras	2
<b>Total</b>	<b>189</b>

Tabla 1: Estatus de las especies de aves de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche

La comunidad reproductora de aves forestales ligadas a **bosques maduros y frescos** (castañares, robledales, algunos alcornocales, bosques mixtos) es bastante rica, singularmente capitaneada por la importante población de **colirrojo real**, por el escaso **abejero europeo** –rapaz muy rara en el sur de Iberia– y por un buen número de parejas de **mosquitero ibérico** (pajarillo exclusivo de la Península Ibérica y el suroeste francés), acompañados por el **reyzuelo listado**, la curruca capirotada, el arrendajo, el herrerillo capuchino, el escribano soteño, el petirrojo europeo o el papamoscas gris. Destacan también los **pícidos**, pues no en vano están presentes los cuatro pájaros carpinteros que pueblan el sur de la Península, que incluso llegan a compartir territorio en bastantes localidades; de ellos, sobresale la población de **pico menor**, la más numerosa de Andalucía (Comunidad donde tiene una distribución muy restringida), mientras que la de **torcecuello** es, asimismo, resaltante en el contexto regional.

También muy interesantes son las formaciones riparias, en las que cabe hablar de **bosques de ribera** bien desarrollados, donde crían algunas de las especies mencionadas arriba como el mosquitero ibérico o el torcecuello, y otras como la **oropéndola**, el picogordo o el ruiseñor común, y donde aparecen en invierno el lúgano o la becada. No son menos interesantes los sotos o **riberas arbustivas** –adelfares y tamujares–, en las que se reproducen el escaso **alzacola**, la tórtola europea o el ruiseñor bastardo. Dichas comunidades vegetales también han sido colonizadas por el invasor pico de coral y son utilizadas en sus migraciones por numerosos pajarillos.

Con frecuencia estas riberas se ven acompañadas por **huertos** en algunos tramos, conformando un paisaje de mosaico de gran atractivo para el pico menor o para el invernante **camachuelo común**, un ave que pasa desapercibida en gran parte de Andalucía.

No obstante, es la **dehesa** de vocación ganadera el hábitat más extendido, con sobresalientes casos de extensas manchas de encinar y alcornocal con árboles de gran porte y ricos en oquedades. En ellas encontramos una buena cantidad de ejemplares de **gorrión chillón**, rabilargo, **curruca mirlona**, alcaudón común, zorzal charlo, totovía, estornino negro, paloma torcaz, abubilla, trepador azul, carbonero común, herrerillo común, cuco común, **pito real ibérico**, pinzón vulgar, cárabo europeo o mochuelo común, además de muchas otras especies.

Las formaciones de **matorral**, de considerable extensión y de distinta composición en función de su orientación en las laderas, grado de humedad, presencia de arbolado, etc., son el hogar de especies típicamente mediterráneas como las curruacas cabecinegra, **carrasqueña y rabilarga**, el chochín, el **escribano montesino**, la **cogujada montesina**, el zarcero común, la perdiz roja, el **chotacabras pardo**, o bien del mirlo capiblanco en paso y del acentor común y el camachuelo en invierno. Los **ambientes rupícolas** son escasos y de poca entidad—lo que limita la aparición de especies amantes de dichos medios—, y se ubican casi siempre en manchas de matorral, enriqueciéndolas con la presencia de aves que suelen anidar entre piedras como el **roquero solitario**, el cernícalo vulgar, el **águila real**, la **collalba rubia**, el **avión roquero** o el **búho real**; en invierno llega a estas zonas el escaso **acentor alpino** y forma importantes dormideros el buitre leonado.

Las **rapaces** son con frecuencia más difíciles de aparejar a un hábitat concreto. Muchas de ellas ubican sus nidos en espacios forestales densos (alcornocal de ladera, pinar, bosque mixto) pero se alimentan en pastizales, dehesas o montes de matorral. Es el caso de algunos de los elementos más emblemáticos de la Comarca, como el **buitre negro** (Sierra Pelada acoge la colonia más grande de Andalucía, y toda la Sierra es una importantísima área de alimentación también para otras colonias cercanas, así como

para individuos no reproductores), el **águila calzada** y la **culebrera europea** (ambas con poblaciones numerosas), el **milano real** (con su segundo bastión reproductor andaluz en la Sierra), el águila real, el **alcotán** o el **milano negro**. Otras, como el **azor**, están ligadas a pinares densos, siendo más generalistas el gavián durante su invernada y el busardo ratonero. No se reproducen actualmente el águila imperial ibérica ni la perdicera, el alimoche ni el halcón peregrino, pero todos ellos llegan a verse cada año durante los pasos migratorios, en invernada o al menos de forma esporádica. Mención especial merece el **buitre leonado**, ya que tampoco cría en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, pero sin embargo mantiene una numerosísima población de aves no reproductoras -mayormente jóvenes e inmaduros- a lo largo de todo el año y especialmente en invierno, cuando estas tierras se convierten en una de las zonas más importantes de España para la especie. La abundancia de ganado manejado en régimen extensivo hace posible que las carroñeras sean uno de los platos fuertes de la ornitología serrana; sin embargo, la práctica desaparición del conejo, entre otros factores, ha provocado que las grandes águilas estén tan mal representadas.

En los parajes de clima mediterráneo el agua siempre es vida, y por ello los ríos y arroyos dan cobijo a muchos pájaros. Así pues, un número importante de alados está asociado a **humedales** en el sentido amplio de la palabra: cauces fluviales de diversa entidad, charcas, diques y embalses. La construcción de numerosas presas en el último tercio del siglo XX ha favorecido la aparición de algunas especies de indudable interés ornitológico, pero poco representativas de los hábitats naturales de Sierra Morena, como el cormorán grande (que ya es incluso reproductor), el **águila pescadora**, la focha común, el somormujo lavanco, las gaviotas sombría y reidora, el rascón europeo, el **avetorillo común**, el carricero tordal o el pájaro moscón. Los cauces serranos, bien conservados y con aguas de buena calidad en general, permiten la presencia de la más importante población reproductora de **cigüeña negra** de Andalucía (nidificante en bosques y riscales, pero necesitada de los ríos para alimentarse), así como su presencia escasa pero regular en invierno y la existencia de varios puntos de concentración de migrantes. También dependientes de los humedales son el ánade azulón, la garza real, la garceta común, la **garceta grande** (invernante rara, pero

también fija en los últimos años), las lavanderas cascadeña y blanca, el martín pescador, el zampullín chico, la gallineta común, la **garza imperial** y la avoceta común en migración, el chorlito chico, los andarríos chico y grande, la agachadiza común, etc. En los puentes que salvan estas corrientes nidifican la **golondrina dáurica**, los aviones común y roquero o el mucho más escaso **vencejo cafre**, y en los taludes arenosos de las mismas excavan sus nidos el **abejaruco común** y el avión zapador, localmente raro.

Los **olivares**, muchos de los cuales no se encuentran en producción en la actualidad y mantienen un importante sotobosque de matorral, así como los menos frecuentes **acebuchales**, son los hábitats más favorables en invierno para los zorzales común y alirrojo, el petirrojo europeo, el **picogordo** o la curruca capirotada.

Los **espacios abiertos** (pastizales, retamares, prados) suelen ser interesantes para ver aves, a pesar de su extensión relativamente pequeña en la Comarca. En migración es posible detectar en ellos a la lavandera boyera, el roquero rojo, los **bisbitas campestre** y arbóreo, la tarabilla norteña, la collalba gris o el **aguilucho cenizo**. La urraca, el **gorrión moruno**, el alcaraván, la codorniz común o el **elanio común** tienen sus reducidas poblaciones serranas limitadas a este tipo de hábitats, donde por otra parte son comunes el triguero, la cogujada común, el cernícalo vulgar, la cigüeña blanca, el **alcaudón real**, el jilguero, el verderón común, el pardillo común o el cuervo, apareciendo en invierno la alondra común, la lavandera banca, la garcilla bueyera, la avefría, el bisbita común o el chorlito dorado.

Por último, hay que hablar de las aves que acompañan el devenir de los serranos en sus **pueblos y aldeas**, y que suelen estar muy presentes en la cultura popular de la Comarca. Golondrinas comunes, aviones comunes, vencejos comunes y **pálidos**, gorriones comunes, lechuzas comunes, colirrojos tizones (en invierno), **roqueros solitarios**, tórtolas turcas o **cigüeñas blancas** son los vecinos más conocidos por la población local, aunque dentro del casco urbano, en jardines o en edificios históricos también se citan puntualmente especies como el acentor alpino, el cárabo europeo, el picogordo, la curruca cabecinegra, el búho real, la abubilla, el treparriscos,

los papamoscas cerrojillo y gris, el verdecillo común, el mochuelo común, el carbonero común, el petirrojo europeo o el herrerillo común, además de rapaces como el águila calzada, el gavián o el milano real. En este apartado, hay que lamentar la desaparición en los años 90 de las últimas colonias de cernícalo primilla de la Sierra, que debían estar en crítica situación tras el abandono de los cultivos de secano, y que encontraron su fin cuando se reformaron ciertos castillos del territorio, en cuyos mechinales anidaban.

Finalmente, nos gustaría resumir que la Sierra de Aracena y Picos de Aroche está dentro del rango de distribución de **11 especies incluidas Catálogo Nacional de Especies Amenazadas**. De ellas, tres (milano real, águila imperial y fumarel común, aunque los dos últimos sólo llegan de modo esporádico o en migración) se encuadran en la máxima categoría, la de “En Peligro de Extinción”. Los otros ocho (cigüeña negra, alimoche, águila pescadora, águila perdicera, buitre negro, aguilucho cenizo, alzacola y colirrojo real) se consideran “Vulnerable”. Ello nos da una idea de la enorme responsabilidad que tiene la Sierra para con la avifauna ibérica, lo cual alcanza sus máximas cotas en lo que atañe al milano real, la cigüeña negra, el buitre negro y el colirrojo real, que tienen en nuestra Sierra importantes poblaciones reproductoras.

## BIBLIOGRAFÍA

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANDALUCÍA. 2001. *Libro Rojo de los vertebrados amenazados de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, Sevilla.

\_\_\_\_\_. *Red de espacios naturales protegidos de Andalucía*. En [www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

\_\_\_\_\_. 2003. *Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, Plan Rector de Uso y Gestión y Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche*. En [www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

\_\_\_\_\_. *Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso*



y Gestión del Paraje Natural Sierra Pelada y Rivera del Aserrador. En [www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

\_\_\_\_\_. *Formularios oficiales de la red de Lugares de Importancia Comunitaria en Andalucía*. 2011. En [www.juntadeandalucia.es/medioambiente](http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente).

MADROÑO y otros (eds.). **Libro Rojo de las Aves de España**. 2004. MMA-SEO/Birdlife [consultable en [www.seo.org](http://www.seo.org)]

MARTÍ, R. & DEL MORAL, J.C. (Eds.). **Atlas de las aves reproductoras de España**. Dirección General de Conservación de la Naturaleza (MMA)-SEO/Birdlife. Madrid. 2003.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. 2011. *Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas*. BOE 46, 23-02-2011.

ROMERO PORRINO, R. 2009. "Las rapaces diurnas de la Sierra de Aracena. Situación, amenazas y recomendaciones para su observación". En *Actas XXIV Jornadas del Patrimonio de la Comarca de la Sierra* (en prensa).

ROMERO PORRINO, R. 2011. *Rutas para ver aves y naturaleza en Sierra Morena. Vol. 1 Sierra de Aracena y Picos de Aroche*. Editorial La Seranía, Ronda.

